



Febbre West Nile

Febbre del Nilo Occidentale

WEST NILE

La febbre West Nile, o febbre del Nilo Occidentale è causata dal virus **West-Nile**, oramai endemico nel nostro territorio, trasmesso con la puntura di **zanzare infette all'uomo** e agli animali, generalmente equini ed uccelli. Le **zanzare** appartengono al genere **Culex**, tra cui la zanzara comune *C. pipiens*.

Il serbatoio di infezione è stato identificato in oltre 70 specie di **uccelli**, soprattutto passeriformi e corvidi, dove il virus può persistere da alcuni giorni a qualche mese.

Consulta il tuo medico se presenti:

- febbre > 38,5 C
- dolori muscolari e alle articolazioni
- cefalea
- confusione
- eruzione cutanea




Se cerchi informazioni o hai dubbi su come proteggerti dalle zanzare contatta il

Dipartimento di Prevenzione della tua Azienda ULSS

Oppure consulta il sito:


<https://www.regione.veneto.it/web/sanita/arbovirosi>



Come posso proteggermi dal rischio di infezione da West-Nile?

Possiamo proteggerci riducendo al minimo il rischio di essere punti dalle zanzare ed evitandone la proliferazione all'interno nel nostro ambiente domestico.

Segui questi semplici ma efficaci comportamenti.



Quando si è all'aperto indossa indumenti di colore chiaro, pantaloni lunghi e maniche lunghe, dal tramonto all'alba (l'attività di questa zanzara è principalmente notturna)



Soggiorna e dormi, laddove possibile, solo in ambienti provvisti di zanzariere alle porte e alle finestre. Per aumentare l'efficacia tratta le zanzariere con repellenti



Usa repellenti cutanei per uso topico. Utilizza spray a base di piretro o altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizza diffusori di insetticida elettrici, areando bene i locali prima di soggiornarvi. Per gli adulti sono consigliati i repellenti DEET e Icaridina ad una concentrazione superiore al 10%. Per i bambini sotto i 2 anni Parametandiol (PMD o Citrodioil)

- Utilizzare i repellenti con moderazione ed attenersi scrupolosamente alle norme indicate nei foglietti illustrativi
- Non utilizzare i repellenti sulle mucose o su regioni cutanee in presenza di lesioni e porre particolare attenzione al loro impiego sui bambini e donne in gravidanza e in allattamento.

Per ulteriori informazioni consulta la brochure "Scelta e corretto utilizzo dei repellenti cutanei per zanzare" all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/sanita/arbovirosi>

Come posso proteggermi dal rischio di infezione da West-Nile?

Possiamo proteggerci riducendo al minimo il rischio di essere punti dalle zanzare ed evitandone la proliferazione all'interno nel nostro ambiente domestico.

Segui questi semplici ma efficaci comportamenti.



Evita le raccolte di acqua stagnante

- **Metti al riparo tutto ciò che può raccogliere acqua.**
- **Elimina i sottovasi dei fiori o ricordati di svuotarli** di frequente, compresi altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante.
- Cambia spesso l'acqua nelle ciotole per gli animali.
- Metti eventuali piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate.

Trattamento di disinfestazione nelle abitazioni private

Attivati per effettuare il **trattamento dei tombini** della tua abitazione. Il trattamento con i larvicidi nelle aree private deve essere effettuato seguendo attentamente le istruzioni, i dosaggi e le tempistiche riportate sull'etichetta del prodotto usato.

E' raccomandata la ripetizione del trattamento dopo un evento piovoso.

Dosaggi suggeriti*:

- per i prodotti in compressa: 1 compressa in ogni tombino/caditoia
- per i prodotti in capsula idrosolubili: 4 capsule in ogni tombino/caditoia

*per il corretto utilizzo si raccomanda di attenersi alla scheda informativa del prodotto usato

Per i trattamenti previsti nelle aree private, compresi i prodotti in compresse dei blister in distribuzione alla popolazione, dovranno essere impiegati formulati contenenti i seguenti principi attivi: ad azione fisico-meccanica; *Bacillus thuringiensis var. israelensis*; Pyriproxyfen; S-Methoprene.